

ALAMEDA COUNTY BEHAVIORAL HEALTH CARE SERVICES

BẢN CHỈ DẪN VỀ THUỐC: CHỐNG ĐIÊN LOẠN/ANTIPSYCHOTIC AGENTS

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> chlorpromazine (Thorazine) | <input type="checkbox"/> thioridazine (Mellaril) |
| <input type="checkbox"/> haloperidol (Haldol) | <input type="checkbox"/> trifluoperazine (Stelazine) |
| <input type="checkbox"/> fluphenazine (Prolixin) | <input type="checkbox"/> perphenazine (Trilafon) |
| <input type="checkbox"/> loxapine (Loxitane) | <input type="checkbox"/> thiothixene (Navane) |
| <input type="checkbox"/> olanzapine (Zyprexa) | <input type="checkbox"/> risperidone (Risperdal) |

Loại khác: _____

Các thuốc chống điên loạn được dùng để trị các chứng lẫn, nghe thấy tiếng nói, bị xáo động, và sợ hãi gây ra bởi chứng tâm thần phân liệt, các bệnh về lưỡng cực, buồn chán; và các triệu chứng khác. Thêm vào đó, thuốc giúp cho bệnh nhân duy trì được khả năng suy nghĩ của mình.

Một số thuốc chống điên loạn có những phản ứng ngược khác nhau so với những loại thuốc tâm thần khác. Một số bệnh nhân sẽ hợp với thuốc này hơn là với các loại thuốc được bào chế trước kia. Thuốc chống điên loạn, cũng như các loại thuốc khác, đều có một số phản ứng như sau:

Thông Thường	Ít Có	Hiếm Hoi
mờ mắt	da nhạy cảm ánh nắng	đột quỵ vì hơi nóng
buồn ngủ	chóng mặt	động kinh
miệng khô	run rẩy	da bị đổi màu
bắp thịt bị cứng	giảm ham muốn tình dục	bệnh hệ thần kinh
ngồi không yên	bắp thịt bị co giật	
lo âu	xáo trộn kinh nguyệt	nghe thở

Tardive Dyskinesia (T.D.) là một triệu chứng gây ra khi hệ thần kinh bị bệnh làm cho mặt và cơ thể bị co giật thành linh, ngoài ý muốn của bệnh nhân. Đối với một số bệnh nhân, trạng thái co giật có thể trở thành thường xuyên, nhưng thường thường sẽ trở lại tình trạng bình thường sau một thời gian. Bác sĩ của bạn sẽ giúp cho bạn phân biệt được các triệu chứng T.D. với các triệu chứng co giật nhẹ hơn của cơ thể như là run rẩy, bắp thịt co giật, và sự bứt rứt, đứng ngồi không yên.

Các loại thuốc này phải được uống đều mỗi ngày và sẽ có hiệu quả từ từ. Phải mất khoảng vài tuần hay vài tháng mới có hiệu quả hoàn toàn.